

Etincel

A fajta elismerve: EU-lista
Fajtatulajdonos: SECOBBA
A fajtatulajdonos képviselője:
Magyarország:
Isterra Magyarország Kft.

ISTERRA

A fajta előnyei


- Hatsoros őszi sörárpa
- Érésidő: korai
- Termőképesség: kiugróan magas
- A betegségek elleni toleranciája jó
- Közepesen magas szár
- Szárszilárdság: közepes
- Kiváló osztályozottság mellett kedvező malátázási tulajdonságok (magas extrakt, alacsony fehérjetartalom)

Betegség-ellenállóság

- Lisztharmat: közepesen ellenálló
- Rhynchosporium: közepesen ellenálló
- Helminthosporium: ellenálló
- Levéltrozsa: közepesen ellenálló
- Sárga mozaik vírus: toleráns

Betegség-ellenállóság

- Alapvetően sörárpanak termelik
- Vetésidő: termelési körzetnek megfelelően (ne vessük túl korán)
- Vetőmagnorma: 3,5 – 4,2 millió élő csíra/ha
- Növekedési regulátorok használata ajánlatos



SY Tepee

A fajta elismerve: EU-lista
Fajtatulajdonos: SYNGENTA
A fajta magyarországi forgalmazója:
Isterra Magyarország Kft.

ISTERRA

A fajta előnyei


- Kétsoros őszi árpa
- Kiemelkedő termőképesség
- Télállósága megfelelő
- Bokrosodás: kiváló
- Közepes növénymagasság
- Szárszilárdság: jó
- Érésidő: korai
- Magas ezerszem tömeg
- Kedvező malátázási tulajdonságok

Betegség-ellenállóság

- Rhynchosporium: jó
- Helminthosporium: jó
- Törperozsda: jó
- Mozaikvírus: rezisztens

Termesztési útmutató

- Vetésidő: október eleje
- Törekedjünk a jó adottságú területek kiválasztására
- Fuzarium fertőzés kialakulása miatt kerüljük a kukorica előveteményt



Calypso

A fajta elismerve: EU-lista
Fajtatulajdonos: LIMAGRAIN
A magyarországi forgalmazója:
Isterra Magyarország Kft.

ISTERRA

A fajta előnyei

- Kétsoros őszi árpa
- Termőképesség: magas
- Télállóság: nagyon jó
- Bokrosodás: kiváló
- Közepes növénymagasság
- Szárszilárdság: átlag feletti
- Érésidő: korai
- Magas ezerszem tömeg – 49 gr
- Osztályozottság: megfelelő


Betegség-ellenállóság

- Közepes ellenállóság a főbb kártevőkkel szemben
- Rhynchosporium: kevésbé érzékeny
- Helminthosporium: kevésbé érzékeny
- Törperozsda: ellenálló
- Mozaikvírus: rezisztens
- Oidium: kissé érzékeny

Termesztési útmutató

- Vetésidő: termelési körzetnek megfelelően (ne vessük túl korán) – október eleje
- Kukorica és nagy szár tömeget maguk után hagyó kultúráknál fokozottan figyeljünk a talaj előkészítésre és a növényvédelemre

Őszi árpa



A fajta előnyei

Kétsoros őszi sörárpa
Termőképesség magas
Télállóság: jó
Bokrosodás: intenzív
Alacsony szár
Szárszilárdsága jó
Érésidő: korai
Magas ezerszem súly
Magas hektolitersúly
Kiváló osztályozottság mellett kedvező malátázási tulajdonságok (magas extrakt, alacsony fehérjetartalom)


Betegség-ellenállóság

Lisztharmat: ellenálló
Rhynchosporium: ellenálló
Törperozsda: közepesen érzékeny
Helminthosporium: enyhén érzékeny
Sárga mozaik vírus: ellenálló

Termesztési útmutató

Magyarország ismert sörárpavidékein sikeresen termelhető
Vetési idő: termelési körzetnek megfelelően (ne vessünk túl korán)
Kukorica és egyéb gabonanövények után: 3,5 – 4,2 millió élő csíra/ha

Őszi takarmányárpa ÚJ!



A fajta előnyei

Hatsoros őszi takarmányárpa
Kiugróan magas terméspotenciál
Érésidő: nagyon korai
Magas hektolitersúly

Betegség-ellenállóság

Rhynchosporium: jó
Helminthosporium: jó
Törperozsda: közepesen érzékeny
Mozaikvírus: rezisztens

Termesztési útmutató

Takarmányárpanak termelik
Vetésidő: október eleje
Vetőmagnorma: 3,5-4,2 millió élő csíra/ha
Növekedési regulátorok használata ajánlott

Isterra által forgalmazott őszi sörárpa fajták kisparcellás terméseredményei 2015.

Szemtermés (tonna/ha)

Fajta	Jászboldogháza	Kaposvár*	Keszthely	Kompolt	Átlag
Calypso	8,75	6,13	7,41	11,16	8,36
Etincel	8,54	4,43	8,19	10,45	7,90
SY Tepee	9,08	5,06	7,35	10,07	7,89
Casanova	8,36	4,64	6,59	10,06	7,41